

**統計モデリング入門 2017 (b)**  
probability distribution and maximum likelihood estimation  
確率分布と最尤推定

久保拓弥 kubo@ees.hokudai.ac.jp  
靈長研の集中講義 <http://goo.gl/76c4i>  
2017-11-14  
ファイル更新時刻: 2017-11-07 15:43

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 1 / 42

もくじ  
今日のハナシ I

- ① 例題: 種子数の統計モデリング  
An example: a distribution of seed number
- ② データと確率分布の対応  
probability distribution, the core of statistical model  
maximum likelihood estimation of parameter  $\lambda$
- ③ ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定?  
もっとともっともらしい推定?  
the functions of statistical model
- ④ 統計モデルの要点  
random number, estimation and prediction  
乱数発生・推定・予測

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 2 / 42

前半のながれ

# 本題にはいる前に 統計モデリング授業前半の 「テーマ」を 再確認しておきましょう

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 3 / 42

前半のながれ  
statistical models appeared in the class  
この授業であつかう統計モデルたち

The development of linear models

```

graph TD
    LM[Linear model] -- "Always normal distribution? That's non-sense!" --> GLM[Generalized Linear Model]
    GLM -- "Incorporating random effects such as individuality" --> GLMM[Generalized Linear Mixed Model]
    GLMM -- "Be more flexible" --> HBM[Hierarchical Bayesian Model]
    HBM -- "parameter estimation MCMC" --> HBM
  
```

Kubo Doctrine: "Learn the evolution of linear-model family, firstly!"

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 4 / 42

前半のながれ

suppose that you have a "count data" set ...  
0 個, 1 個, 2 個と数えられるデータ

カウントデータ ( $y \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  なデータ)

response variable  $y$   
e.g. egg number  
(たとえば卵数)  
explanatory variable  
e.g. body size  
(たとえば体重)

応答変数  
説明変数

• たとえば  $x$  は植物個体の大きさ,  $y$  はその個体の花数  
• 体サイズが大きくなると花数が増えるように見えるが.....  
• この現象を表現する統計モデルは?

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 5 / 42

前半のながれ

the normal distribution ... is NOT this one!  
正規分布を使った統計モデル ..... ムリがある?

正規分布・恒等リンク関数の統計モデル

response variable  $y$   
explanatory variable  
応答変数  
説明変数

NO!

とにかくセンひきやい! いんじょ  
傾き「ゆーい」ならいいんじょ  
...という安易な発想のデータ解析

- タテ軸のばらつきは「正規分布」なのか?
- $y$  の値は 0 以上なのに .....
- 平均値がマイナス?

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 6 / 42

前半のながれ

the Poisson distribution approximates data  
ポアソン分布を使った統計モデルなら良さそう?!

ポアソン分布・対数リンク関数の統計モデル

response variable  $y$   
応答変数

explanatory variable 説明変数

- タテ軸に対応する「ばらつき」 fair distribution
- 負の値にならない「平均値」 non-negative mean
- 正規分布を使ってるモデルよりましたね bye-bye, the normal distribution

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 7 / 42

前半のながれ

## データの性質をよくみる

Plot your data and observe it

### 確率分布という部品を選ぶ

Choose proper distributions

## 「正規分布」は万能ではない!

the normal distribution is NOT good at everything

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 8 / 42

前半のながれ

### 今日の内容と「統計モデリング入門」との対応

今日はおもに「**第2章 確率分布と統計モデルの最尤推定**」の内容を説明します。

- 著者: 久保拓弥
- 出版社: 岩波書店
- 2012-05-18 刊行

<http:// goo.g1/Ufq2>

久保拓弥

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 9 / 42

例題: 種子数の統計モデリング An example: a distribution of seed number

### 2. 例題: 種子数の統計モデリング

An example: a distribution of seed number

R でデータをあつかいつつ

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 10 / 42

例題: 種子数の統計モデリング An example: a distribution of seed number

a simplified data set, easy to understand

この授業では架空植物の架空データをあつかう

number of seeds taken from 50 imaginary plants

理由: よけいなことは考えなくてすむので

現実のデータはどれも授業で使うには難しすぎる.....

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 11 / 42

例題: 種子数の統計モデリング An example: a distribution of seed number

number of seeds per plant individual  
こんなデータ(架空)があったとしましょう

まあ, なんだかこういうへんな植物を調査しているとします  
individual  $i$   
個体  $i$   
 $i \in \{1, 2, 3, \dots, 50\}$

seed number of  $i$   
種子数  $y_i$   
この  $\{y_i\}$  が観測データ!  
 $\{y_i\} = \{y_1, y_2, \dots, y_{50}\}$

このデータ  $\{y_i\}$  がすでに R という統計ソフトウェアに格納されていた, としましょう

```
> data
[1] 2 2 4 6 4 5 2 3 1 2 0 4 3 3 3 3 4 2 7 2 4 3 3 3 4
[26] 3 7 5 3 1 7 6 4 6 5 2 4 7 2 2 6 2 4 5 4 5 1 3 2 3
```

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i1>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 12 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number

R: a free statistical software  
これ使いましょう: 統計ソフトウェア R  
<http://www.r-project.org/>




- いろいろな OS で使える free software
- 使いたい機能が充実している
- 作図機能も強力
- S 言語によるプログラミング可能
- RStudio <http://www.rstudio.com/>

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 13 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number

RStudio



http://www.rstudio.com/

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 14 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number

apply table() to categorize data  
R でデータの様子をながめる




の table() 関数を使って種子数の頻度を調べる

```
> table(data)
 0 1 2 3 4 5 6 7
 1 3 11 12 10 5 4 4
(種子数 5 は 5 個体, 種子数 6 は 4 個体 .....
```

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 15 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number

start with data plotting, always  
とりあえずヒストグラムを描いてみる



http://www.rstudio.com/


kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 16 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number

How to evaluate mean value using R?

```
> mean(data)
[1] 3.56
> abline(v = mean(data))

```



kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 17 / 42

例題: 種子数の統計モデリング | An example: a distribution of seed number


statistics to represent dispersion  
「ばらつき」の統計量

あるデータの ばらつき をあらわす標本統計量の例: 標本分散 sample variance

```
> var(data)
[1] 2.9861
```

sample standard deviation  
標本標準偏差 とは標本分散の平方根 ( $SD = \sqrt{variance}$ )

```
> sd(data)
[1] 1.7280
> sqrt(var(data))
[1] 1.7280
```



kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 18 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

### 3. データと確率分布の対応

probability distribution, the core of statistical model

確率分布は統計モデルの重要な部品

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 19 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

### Empirical VS Theoretical Distributions

統計モデルの部品である 確率分布 には  
“データそのまま”な 経験分布 と  
数式で定義される理論的な分布 がある

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 20 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

### “データそのまま”な 経験分布

empirical distribution

“データそのまま”な 経験分布

> data.table <- table(factor(data, levels = 0:10))  
> cbind(y = data.table, prob = data.table / 50)

y	prob
0	0.02
1	0.06
2	0.22
3	0.24
4	0.20
5	0.10
6	0.08
7	0.08
8	0.00
9	0.00
10	0.00

Frequency

data

• 確率分布とは 発生する事象 と 発生する確率 の 対応づけ  
• 確率分布のひとつである 経験分布 とは ..... “たまたま手もとにある” データから “発生確率” を決める確率分布

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 21 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

なるほど経験分布は“直感的”かもしれないが.....

- データが変わると確率分布が変わる?
- 種子数  $y = \{0, 1, 2, \dots\}$  となる確率が，個々におたがい無関係に決まる?
- パラメーターは  $\{p_0, p_1, p_2, \dots, p_{99}, p_{100}, \dots\}$  無限個ある?

道具として使うには，ちょっと不便かもしれない.....

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 22 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

なにか理論的に導出された確率分布のほうが便利ではないか?

- 少数のパラメーターで分布の“カタチ”が決まる
- “なめらかに” 確率が変化する
- いろいろと数理的な道具が準備されている (パラメーター推定方法など)

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 23 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

Mathematical expression of the Poisson distribution

確率分布 (ポアソン分布) を数式で決めてしまう

probability 種子数が  $y$  である 確率 は以下のように決まる，と考えている

$$p(y | \lambda) = \frac{\lambda^y \exp(-\lambda)}{y!}$$

- $y!$  は  $y$  の階乗 で，たとえば  $4!$  は  $1 \times 2 \times 3 \times 4$  をあらわしています。
- $\exp(-\lambda) = e^{-\lambda}$  のこと ( $e = 2.718\dots$ )
- ここではなぜポアソン分布の確率計算が上のようになるのかは説明しません— まあ，こういうもんだと考えて先に進みましょう

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 24 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

the Poisson distribution  
数式で決められたポアソン分布?

とりあえず R で作図してみる

```
> y <- 0:9 # これは種子数（確率変数）
> prob <- dpois(y, lambda = 3.56) # ポアソン分布の確率の計算
> plot(y, prob, type = "b", lty = 2) # cbind で「表」作り
> cbind(y, prob)
y prob
1 0.02843882
2 0.10124222
3 0.18021114
4 0.21385056
5 0.19032700
6 0.13551282
7 0.08040427
8 0.04089132
9 0.01819664
10 0.00719778
```

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 25 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

the Poisson distribution represent data?  
データとポアソン分布を重ね合わせる

Histogram of data

```
> hist(data, seq(-0.5, 8.5, 0.5)) # まずヒストグラムを描く
> lines(y, prob, type = "b", lty = 2) # その「上」に折れ線を描く
```

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 26 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

parameter  $\lambda$  is the mean of the Poisson distribution  
パラメーター  $\lambda$  はポアソン分布の平均

• 平均  $\lambda$  はポアソン分布の唯一のパラメーター

• 確率分布の平均は  $\lambda$  である ( $\lambda \geq 0$ )

• 分散と平均は等しい:  $\lambda = \text{平均} = \text{分散}$

•  $y \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$  の値をとり、すべての  $y$  について和をとると 1 になる

$$\sum_{y=0}^{\infty} p(y | \lambda) = 1$$

```
> # cbind で「表」作り
> cbind(y, prob)
y prob
1 0.02843882
2 0.10124222
3 0.18021114
4 0.21385056
5 0.19032700
6 0.13551282
7 0.08040427
8 0.04089132
9 0.01819664
10 0.00719778
```

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 27 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

The Poisson distribution is useful if ...  
どういう場合にポアソン分布を使う?

統計モデルの部品としてポアソン分布が選んだ理由:

- データに含まれている値  $y_i$  が  $\{0, 1, 2, \dots\}$  といつた非負の整数である (カウントデータである)
- $y_i$  に下限 (ゼロ) はあるみたいだけど上限はよくわからない
- この観測データでは平均と分散がだいたい等しい
  - このだいたい等しいがあやしいのだけど、まあ気にしないことにしましょう

mean  $\approx$  variance

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 28 / 42

データと確率分布の対応 | probability distribution, the core of statistical model

$\lambda$  changes the shape of distribution  
ポアソン分布の  $\lambda$  を変えてみる

$p(y | \lambda) = \frac{\lambda^y \exp(-\lambda)}{y!}$   $\lambda$  は平均をあらわすパラメーター

lambda	3.5	7.7	15.1
3.5	0.0284	0.0000	0.0000
7.7	0.0000	0.0100	0.0000
15.1	0.0000	0.0000	0.0080

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 29 / 42

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 | もっともっともらしい推定?

maximum likelihood estimation of parameter  $\lambda$   
4. ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定

もっとももっともらしい推定?

“fitting” = “parameter estimation”  
「あてはめる」ことは推定すること

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 30 / 42

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

## 尤度 (likelihood) とは何か?

- maximum likelihood estimation
- 最尤推定法 では、尤度 というあてはまりの良さをあらわす統計量に着目
- 尤度はデータが得られる確率をかけあわせたもの
- この例題の場合、パラメーター  $\lambda$  を変えると尤度が変わる  
goodness of fit
- もっとも「あてはまり」が良くなる  $\lambda$ を見つけて
- たとえば、いまデータが3個体ぶん、たとえば、  
 $\{y_1, y_2, y_3\} = \{2, 2, 4\}$ 、これだけだった場合、尤度はだいたい  
 $0.180 \times 0.180 \times 0.19 = 0.006156$  といった値になる

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

likelihood  $L(\lambda)$  depends on the value of mean,  $\lambda$   
尤度  $L(\lambda)$  はパラメーター  $\lambda$  の関数

この例題の尤度 (the likelihood definition for the example):

$$\begin{aligned} L(\lambda) &= (y_1 \text{が } 2 \text{ である確率}) \times (y_2 \text{が } 2 \text{ である確率}) \\ &\quad \times \cdots \times (y_{50} \text{が } 3 \text{ である確率}) \\ &= p(y_1 | \lambda) \times p(y_2 | \lambda) \times p(y_3 | \lambda) \times \cdots \times p(y_{50} | \lambda) \\ &= \prod_i p(y_i | \lambda) = \prod_i \frac{\lambda^{y_i} e^{-\lambda}}{y_i!}, \end{aligned}$$

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

evaluate not likelihood, but log likelihood!  
尤度はしんどいので対数尤度を使う

尤度は確率 (あるいは確率密度) の積であり、あつかいがふべん (大量のかけ算!)

そこで、パラメーターの最尤推定では、対数尤度関数 (log likelihood function) を使う

$$\log L(\lambda) = \sum_i \left( y_i \log \lambda - \lambda - \sum_k^y \log k \right)$$

対数尤度  $\log L(\lambda)$  の最大化は尤度  $L(\lambda)$  の最大化になるから  
まずは、平均をあらわすパラメーター  $\lambda$  を変化させていったときに、ポアソン分布のカタチと対数尤度がどのように変化するのか調べてみましょう

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

$\lambda$  changes the log likelihood, i.e., goodness of fit  
λを変えるとあてはまりの良さが変わる

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

seek the maximum likelihood estimate,  $\hat{\lambda}$   
対数尤度を最大化する  $\hat{\lambda}$  をさがす

対数尤度  $\log L(\lambda) = \sum_i (y_i \log \lambda - \lambda - \sum_k^y \log k)$

$\hat{\lambda} = 3.56$

- 最尤推定量 (ML estimator):  $\sum_i y_i / 50$  標本平均値!
- 最尤推定値 (ML estimate):  $\hat{\lambda} = 3.56$  ぐらい

ポアソン分布のパラメーターの 最尤推定 もっとももっともらしい推定?

no one knows “the true  $\lambda$ ” based on finite size data  
最尤推定を使っても真の  $\lambda$  は見つからない

真の  $\lambda$  が 3.5 と設定して架空データを生成

データは有限なので真の  $\lambda$  はわからない  
標本サイズが 50 の場合，“平均値の推定”すらなかなかうまくできない

統計モデルの要点

乱数発生・推定・予測

the functions of statistical model

## 5. 統計モデルの要点

random number, estimation and prediction  
乱数発生・推定・予測

統計モデルとデータの対応づけ

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 37 / 42

統計モデルの要点

random number generation estimation

## 確率分布: 亂数発生 と 推定

(人間には見えない)  
真の統計モデル  
 $\lambda = 3.5$  のポアソン分布

観測データから  
推定された  
 $\lambda = 3.56$  のポアソン分布

パラメーター推定

観測されたデータ

データをサンプル  
確率分布から乱数を発生

データ?...ここでは確率・統計モデルが生成していると仮定

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 38 / 42

統計モデルの要点

乱数発生・推定・予測

## 推定されたモデルを使った 予測

(人間には見えない)  
真の統計モデル  
 $\lambda = 3.5$  のポアソン分布

観測データから  
推定された  
 $\lambda = 3.56$  のポアソン分布

予測: 新しいデータに  
あてはまるのか?  
(予測の良さを調べている)

新しいデータをサンプル

同じ調査方法で得られた新データ

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 39 / 42

統計モデルの要点

probability distributions appeared in the class

## この講義で登場する確率分布

- ポアソン分布:  $y \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  となるデータ、「 $y$  回なにかがおこった」
- 二項分布:  $y \in \{0, 1, 2, \dots, N\}$  となるデータ、「 $N$  個のうち  $y$  個で何かがおこった」
- 正規分布:  $-\infty < y < \infty$  の連続値をとるデータ
- その他あれこれ — ちょっと登場するだけ

そんなに多くの確率分布は登場しません

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 40 / 42

統計モデルの要点

乱数発生・推定・予測

## いろいろな確率分布があるけれど.....

- この講義では多種多様な確率分布をつかいません
- しかし 確率分布を混ぜあわせる ことによって、自分で確率分布を作り出すことができます
- ハナシの後半に登場する GLMM や階層ベイズモデル

線形モデルの発展

階層ベイズモデル (HBM)  
より自由な統計モデルが!

複数型・複数差といった変動効果をあつかいたい

一般化線形混合モデル (GLMM)

正規分布以外の確率分布をあつかいたい

一般化線形モデル (GLM)

最小二乗法

線形モデル

推定計算方法 MCMC

最高推定法

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 41 / 42

統計モデルの要点

乱数発生・推定・予測

## 次回予告

The next topic

YES!

## 一般化線形モデルのひとつ: ポアソン回帰

Poisson Regression, a Generalized Linear Model (GLM)

kubostat2017b (<http://goo.gl/76c4i>) 統計モデリング入門 2017 (b) 2017-11-14 42 / 42